

BEITRAG
ZUR
AETIOLOGIE UND THERAPIE DES
NABELSCHNURVORFALLES
BEI
KOPFLAGEN.

INAUGURAL-DISSERTATION

ZUR

ERLANGUNG DER DOCTORWÜRDE

IN DER

MEDICIN, CHIRURGIE UND GEBURTSHÜLFE,

WELCHE

NEBST BEIGEFÜGTEN THESEN

MIT ZUSTIMMUNG DER HOHEN MEDICINISCHEN FACULTÄT
DER UNIVERSITÄT GREIFSWALD

AM DONNERSTAG, DEN 2. JUNI 1881,

NACHMITTAGS $\frac{1}{2}$ 2 UHR,

ÖFFENTLICH VERTHEIDIGEN WIRD

GOTTHOLD SCHAEFER

CAND. MED.

AUS BRANDENBURG.

OPPONENTEN:

M. DIETERICH, CAND. MED.

C. STRANGMEIER, CAND. MED.

DR. MED. A. KLARE, PRACT. ARZT.

GREIFSWALD.

DRUCK VON CARL SEILL.

1881.

SEINEN

THEUREN ELTERN

AUS KINDLICHER LIEBE UND DANKBARKEIT

GEWIDMET

VOM

VERFASSEN.

Zu den Ereignissen, welche unangenehme Störungen während der Geburt herbeiführen, ist schon seit langer Zeit auch der Vorfall der Nabelschnur gezählt worden, nicht etwa, weil er den Geburtsverlauf an sich sehr behinderte, sondern vielmehr das Leben des Kindes so gefährdet, dass leider der Procentsatz der bei Nabelschnurvorfälle zu Grunde gegangenen Kinder immer noch ein sehr grosser gewesen ist. Warum aber dies Letztere in früheren Jahren der Fall war, glaube ich, liegt wohl daran, dass sowohl in Betreff der Aetiologie die grössten Meinungsverschiedenheiten, als im Besondern in Bezug auf Behandlung des Nabelschnurvorfalles die schroffsten Gegensätze in der Literatur verzeichnet sind, dass man also einerseits sich nicht völlig klar darüber war, wodurch vor Allem der Vorfall der Nabelschnur bedingt wurde, andererseits, dass man bei der Behandlung — mag es nun aus Gründen geschehen sein, welche es wollen — das einfachste und natürlichste Verfahren hintenansetzte und lieber

Operationen unternahm, die für Mutter und Kind gleich gefährlich waren. In den letzten 40 Jahren sind es Hueter, Michaelis und Hildebrandt gewesen, welche durch Veröffentlichung verschiedener Fälle, in denen sie durch Anwendung der Reposition bei Nabelschnurvorfall bedeutend bessere Resultate erzielten, diesem einfachen Operationsverfahren Bahn gebrochen und es in gegebenen Fällen zur häufigeren und den meisten Erfolg versprechenden Anwendung warm empfohlen haben.

Meine Aufgabe soll es nun sein, in Nachfolgendem an der Hand einer aus den Greifswalder geburtsbülflichen Journalen (1858—1880) entnommenen Statistik den Nachweis zu liefern, dass auch hier durch die bei Kopflagen angewandte Reposition die günstigsten Resultate erzielt worden sind.

Der Vorfall der Nabelschnur gehört keineswegs zu den ganz seltenen Erscheinungen, jedoch variiren die Angaben über seine Frequenz ganz ungemein. So stellt sich das Verhältniss nach Schuré = 1 : 265, nach Scanzoni = 1 : 254, nach Churchill = 1 : 232 und nach Saxtorph = 1 : 243. Eine viel grössere Häufigkeit aber constatirten Michaelis und Spiegelberg, nach denen bei ersterem sich das Verhältniss = 1 : 88 und bei letzterem = 1 : 86 stellt, und ferner noch Busch und ein neuerdings erschienener Bericht aus der Halle'schen Poliklinik, bei denen sich das Verhältniss wie 1 : 57 und 1 : 33 ergab. Ich habe in den Journalen der Greifswalder Klinik

und Poliklinik in dem Zeitraum von 22 Jahren unter 5871 Geburten 103 Fälle von Nabelschnurvorfällen gefunden, von denen 86 Kopflagen und 17 Steiss- und Fusslagen waren. (Abzurechnen sind von der Gesamtziffer die Aborte und Placentarlösungen, ebenso die Schulter- und Querlagen, da bei letzteren beiden Kunsthülfe stets in Anwendung gezogen werden muss, aus diesem Grunde also ein prolapsus funiculi umbilicalis nicht sonderlich in Betracht kommen kann, wonach sich die Gesamtzahl auf ca. 5160 Fälle belaufen würde.) Diesem Resultate gemäss würde sich in der hiesigen Klinik das Verhältniss der vorgekommenen Nabelschnurvorfälle zu den übrigen Geburten etwa wie 1 : 50 verhalten. Für Vorfälle bei Kopflagen allein ergibt sich aber nach Abzug der übrigen 17 Fälle bei Beckenendlagen das Verhältniss = 1 : 60. Bei der Frequenz ist ferner noch zu beachten, dass die Zahlen betreffend das Vorkommen bei Erst- oder Mehrgebärenden nach allen bisher darüber aufgestellten Statistiken sehr differiren; bei uns stellt sich das Verhältniss so, dass der Vorfall 9 Mal bei Primiparen und 75 Mal bei Multiparen constatirt worden ist; 2 Fälle kommen ausser Betracht, da bei ihnen nicht hat festgestellt werden können, wievielgebärend die betreffenden Kreissenden waren.

Was die Aetiologie des Nabelschnurvorfalles bei Kopflagen anbetrifft, so ist Michaelis der erste gewesen, der allein ausgehend von dem bei der Ge-

burt stattfindenden physiologischen Verhalten zwischen Frucht und Uterus die ursächlichen Momente dieses pathologischen Zustandes zu erforschen suchte. Nach seiner Ansicht *) giebt es „Mittel, welche die Natur anwendet, die Nabelschnur zurückzuhalten.“ Einerseits ist es die Lage derselben in dem hohlen Raume, den die vordere concave Fläche des Kindes bildet, in welchem sie jedem Druck anweichen kann und so ihre Lage bei wenigem Fruchtwasser gesichert erscheint, ferner die Verringerung des Fruchtwassers in der letzten Schwangerschaftszeit. Ausserdem behindere Umschlingung der Nabelschnur um Extremitäten, hauptsächlich aber um den Hals den Vorfall. Hohl, Naegele, Scanzoni u. A. halten die Umschlingung für einen pathologischen Zustand und sehen darin etwas Nachtheiliges für das Kind. Ihnen gegenüber stehen Andere, wie z. B. Michaelis, der bei zu langer Nabelschnur in der Umschlingung das sicherste Mittel sieht, den Vorfall zu verhüten, und Hildebrandt, **) der der Ansicht ist, dass „in der That bei der Häufigkeit des Vorkommens die Umschlingung als ein wahrscheinliches Schutzmittel gegen den Vorfall bei sehr vielen Geburten angesehen werden kann; es frage sich aber, ob dieses Schutzmittel in allen Fällen ausreiche.“ Der sicherste

*) Michaelis, Abhandl. aus d. Gebiete d. Geburtshülfe p. 269 u. f.

**) Hildebrandt, Beiträge zur Aetiologie u. Behandlung des Nabelschnurvorfalles bei Kopflagen.

Schutz für die Nabelschnur ist — was gerade Michaelis *) so vortrefflich bewiesen hat — in dem Verhalten des Uterus während der Geburt zu suchen. Die Geburt beginnt mit Aufhebung der während der Schwangerschaft dauernden Contraction der Vaginalportion, die Erweiterung des äussern und innern Muttermundes geht vor sich. Allmählich schreitet dieser Zustand über auf den Abschnitt des Uterus, der den vorliegenden Theil umgiebt, von da verbreitet sich die Contraction immer weiter aufwärts bis zum fundus, womit die Geburt ihr Ende erreicht. Diese energische, regelmässige und stetig zunehmende Uteruscontraction ist nun nach Michaelis das Hauptmittel, einerseits den vorliegenden Kopf dem Becken gemäss zu configuriren, andererseits aber durch den genauen Anschluss, welcher dabei zwischen dem Kopf und dem untern Uterinsegment stattfindet, die Lage der Nabelschnur zu sichern, einen Vorfall dadurch zu verhüten, dass die Nabelschnur durch die allmählich aufschreitende Contraction am Kopf entlang emporgeschoben wird.

Alle ätiologischen Momente, die von älteren und neueren Autoren für Nabelschnurvorfall angeführt sind, fallen hiernach also unter eine Rubrik, nämlich: „ungenauues Anschliessen des untern Uterinsegmentes an den vorliegenden Kindestheil.“ **) Abgewichene

*) Michaelis, Abhandl. aus d. Gebiete d. Geburtshülfe p. 274 u. f.

**) Neue Zeitschrift f. Geburtskunde, Bd. III, p. 38 u. f.

Kindeslage und gleichzeitiges Vorhandensein von viel Fruchtwasser befördern diese Unthätigkeit des Uterus, andererseits hemmen Zwillinge oder schneller Abfluss des Fruchtwassers die regelmässige Contraction, ferner kann die mangelnde Contraction davon die Folge sein, dass der voranstehende Kindes- theil nicht tief genug auf die Vaginalportion herab- sinkt; derartige regelwidrige Lage findet man häufig bei Beckenverengerung, starker Beckenneigung, venter propendens. Ausserdem sind von einzelnen Autoren als Nabelschnurvorfal effectuirend bezeichnet: Pla- centa praevia mit oder ohne marginale Insertion, abnorme Länge der Nabelschnur, Vorfal von Ex- tremitäten neben dem Kopfe u. A. m.

Erwägen wir nun nach der hinten beigefügten Statistik die Häufigkeit der verschiedenen eben an- geführten causaln Momente des Nabelschnurvorfalles zu einander, so ergiebt sich für unsere 86 Fälle folgende Uebersicht:

1. Vorhandensein von Zwillingen . . .	11 Mal.
2. Tiefer Sitz der Placenta	8 „
3. Umschlingung um den Hals	3 „
4. Enges Becken	6 „
5. Starke Beckenneigung	3 „
6. Hängebauch	5 „
7. Abnorme Länge der Nabelschnur . . .	6 „
8. Vorfal von Extremitäten	16 „
9. Abnorme Kopflagen (Abgewichen- sein und Hochstand)	30 „

In Bezug auf die Diagnose erwachsen dem Geburtshelfer bei Vorfall nur dann Schwierigkeiten, wenn die vorgefallene Schnur sich etwa ganz an der Peripherie des Kopfes hinzieht und so der untersuchenden Hand leicht entgehen kann. Für bedeutend schwieriger dürfte die Diagnose bei noch stehender Blase zu halten sein: wenn dieselbe straff gespannt ist, sich viel Fruchtwasser vor dem Kopf befindet und die vorliegende Schnur nur klein ist.

Auf den Hergang des Geburtsactes ist der Vorfall der Nabelschnur von keinem Einfluss, da dieselbe an und für sich kein mechanisches Hinderniss bietet. Aber in prognostischer Hinsicht sind Mutter und Kind wegen der nachtheiligen Folgen wohl in Erwägung zu ziehen. Für die Mutter können insofern Gefahren entstehen, dass durch eine quer über den Kopf gespannte Nabelschnur leicht Zerrung an den Eihäuten, somit frühzeitige gewaltsame Placentarlösung und als schwere Folge davon leicht Metrorrhagie veranlasst werden kann, oder dass durch die Zerrung der Nabelschnur unregelmässige Uteruscontractionen hervorgerufen werden können, welche die Geburt verzögern und nachträglich Retention der Placenta durch Krampf am innern Muttermund veranlassen. Andererseits darf man aber auch abgesehen von den Schmerzen nicht die Gefahren unterschätzen, denen die Mutter durch eine wegen Nabelschnurvorfalls vorgenommene Operation ausgesetzt ist.

Man rufe sich nur die nachtheiligen Folgen der Zange und der Wendung ins Gedächtniss!

Anders ist es nun allerdings bei dem Kinde, für dieses treten von vornherein Gefahren durch den Vorfall ein. Früher nahm man allgemein an, dass in der vorgefallenen durch die äussere Temperatur kaltwerdenden Schlinge das Blut coagulire und so die Circulation zwischen Placenta und Frucht gehindert werde. Nach neuerer Anschauung hält man dies als nicht wohl möglich, indem zu erwägen ist, ob das schnelle und plötzliche Erkalten der Nabelschnur Ursache oder Folge des schwindenden Lebens ist. Heute vielmehr ist man zu der Ansicht geneigt, dass die Gefahr für das Kind allein durch die durch Druck auf die Nabelschnurgefässe entstehende Unterbrechung der Circulation bedingt werde. Nach d'Outrepont's und Hueter's Beobachtungen soll schon vor Beginn der Geburt bei noch stehender Blase eine Gefahr für das Kind durch Compression der Nabelschnurgefässe entstehen. Dieser Druck wird dem Kinde doch aber erst bei festerer Einstellung des Kopfes nach dem Blasensprung gefährlich.

Wenden wir uns nun zur Therapie des Nabelschnurvorfalles, wie sie bei Kopflagen angewandt worden ist, so wird auch in der älteren Literatur die Reposition als ein vielfach angewandtes Verfahren angegeben, denn Mauriceau, Peu, de la Motte, Wiegand, Naegele u. A. führten sie

selbst aus und empfahlen sie auch. Die entschiedensten Verfechter dieser Operationslehre sind Hueter und Michaelis und in neuerer Zeit auch Hildebrandt. Hueter hält die Reposition als das für die Mutter schonendste und für das Kind unbedingt heilbringendste und auch unter den schwierigsten Complicationen die günstigsten Resultate erzielende Verfahren; er führt unter andern in seiner Abhandlung über den Vorfall der Nabelschnur einen Fall an, wo die vorgefallene Nabelschnur nicht mehr pulsirte, nach der Reposition sich die Pulsation vollkommen wiederherstellte und ein lebendes Kind zur Welt gefördert wurde. Michaelis, der jedesmal bei Vorfall der Nabelschnur reponirte, veröffentlicht aus einem Zeitraum von 4 Jahren 11 Nabelschnurvorfälle bei Kopflagen, bei welchen insgesamt die Reposition gelang; in 2 Fällen wurden allerdings die Kinder todtgeboren. Hildebrandt *) veröffentlicht 17 Fälle, unter denen bei einem Wendung auf den Kopf in den unversehrten Eihäuten gemacht und so die Nabelschnur retentirt wurde; unter den übrigen 16 Fällen wurde 1 mal nicht reponirt, sondern gleich Zange angelegt und ein todttes Kind geboren, 3 mal misslang die Reposition und alle drei Früchte waren todt, 2 mal gelang die Reposition und wurde von diesen 1 durch Wendung auf den Kopf und 1 durch Wendung auf den Fuss lebend

*) Hildebrandt, Beiträge zur Aetiologie und Behandlung des Nabelschnurvorfalles bei Kopflagen, p. 116 c. f.

zur Welt gebracht; in den übrigen 10 Fällen gelang die Reposition ebenfalls sehr gut, doch wurde der weitere Verlauf der betreffenden Geburten der Natur überlassen und alle 10 Früchte lebend geboren. Wegscheider*) erlebte in 5 Viertel Jahren 8 Fälle von Nabelschnurvorfall, wobei 2 Kinder todt, 6 lebend zur Welt kamen, 4 mal lag die Nabelschnur neben dem Kopf allein, 1 mal neben Kopf und Arm, 2 mal neben den Füßen, 1 mal bei Querlage. Die Reposition wurde 5 mal gemacht, 4 lebende Kinder geboren. In Summa 75 % lebend. Bei uns ist unter 86 Nabelschnurvorfällen bei Kopflagen die Reposition 12 mal gelungen und 11 Früchte lebend geboren; in 30 Fällen wurde nicht reponirt, sondern sofort Wendung gemacht, hiervon 20 lebend geboren; in weiteren 15 Fällen wurde ebenfalls nicht reponirt, sondern sofort die Zange applicirt, hiervon 11 lebend; in ferner 12 Fällen erfolgte die Austossung ohne Reposition spontan, hiervon 5 lebend geboren; endlich in den übrig bleibenden Fällen ist die Reposition misslungen und wurden durch die Wendung 5 lebende und 3 todt und durch die Zange 1 lebend geboren. Den Gegnern der Repositionsmethode könnten durch die letzteren Angaben über misslungene Repositionsversuche neue Angriffspunkte gegeben werden, doch muss man die besonderen Umstände in Erwägung ziehen, welche in

*) Verhandlungen d. Gesellschaft f. Geburtshülfe in Berlin, Heft VI, p. 106.

diesen Fällen die Reposition zu einem ungünstigen Verfahren machten. Die Complicationen bei unsern 17 misslungenen Fällen waren: Hoher Kopfstand bei engem Becken, Placenta praevia mit insertio marginalis, abnorme Länge bei beweglichem Kopf, Hängebauch mit frühzeitigem Wasserabfluss und Vorfall einer Hand, wiederholter Vorfall einer sehr grossen Schlinge bei sehr reichlichem Fruchtwasserabfluss, frühzeitiger Fruchtwasserabfluss mit schwachen Wehen und in Folge dessen Nichteinstellen des Kopfes wegen mangelhafter Contraction des Uterus. Unter derartigen Complicationen, glaube ich, können trotz der grössten Geschicklichkeit im Reponiren, trotz der grössten Ausdauer und Geduld dabei, jedem Geburtshelfer Fälle von misslungener Reposition vorkommen.

Diese von mir angeführten Zahlen sprechen nun so sehr zu Gunsten der Reposition, dass ich es für ungerechtfertigt halte, wollte man dieser Methode ohne Weiteres noch fernerhin das absprechen, dass sie unter den bei Nabelschnurvorfällen angewandten Operationsmethoden das unbedingt heilbringendste Verfahren ist. Ich füge allerdings gleich hinzu, dass nicht für jeden Fall die Reposition das beste ist, sondern im betreffenden Falle auch unter gewissen Complicationen eine andere Therapie eingeschlagen werden muss; unsere Statistik liefert aber den Beweis, dass die Reposition trotz unangenehmer Beigaben wie Vorfall an der vordern Beckenwand doch

immer wohl ausführbar und die von dem günstigsten Erfolg begleitete Therapie ist.

In Bezug auf die anzuwendende Therapie muss man sich ganz darnach richten, wie weit die Geburt vorgeschritten ist. Fühlt man die Schnur bei noch stehender Blase vorliegend, so soll man nach den meisten Autoren sich vollständig expectativ verhalten, sein Bestreben hauptsächlich dahin richten, dass die vorliegende Schnur nicht später auch vorfällt, also den Blasensprung verhüten. Man erreicht dies am besten durch vollkommen ruhige, horizontale Lage der Kreissenden und durch möglichst schonendes Untersuchen. Andere, wie Hueter und Hohl, sprechen sich dahin aus, dass, falls die vorliegende Schlinge klein, der Muttermund vollständig erweitert ist und der Kopf in die obere Apertur eingestellt ist, man mit den Fingerspitzen das Zurückschieben der Schlinge neben dem sich vorwärts bewegenden Kopf vornehmen soll. Dies kann doch aber immer nur dann geschehen, wenn der Kopf noch beweglich ist; denn steht derselbe bereits fest, so treten Druckerscheinungen ein und in diesem Falle ist sofort eine andre Operation indicirt. Für die Fälle, wo bei Vorlagerung der Schnur der Kopf noch beweglich steht, aber der baldige Blasensprung vermuthet wird, räth Hildebrandt durch Einstellen des Kopfes auf das untere Uterinsegment durch äussere Handgriffe eine genaue Anschliessung zwischen den beiden

herbeizuführen und so auf natürlichem Wege die Selbstreposition zu befördern.

Ist der Blasensprung erfolgt und gleich darauf der Vorfall, so kommen folgende Punkte bei der Wahl der etwa vorzunehmenden Operation in Betracht: Erweiterung des Muttermundes, Pulsation der vorgefallenen Schlinge, Stand des Kopfes im Becken, Beckenenge, gleichzeitiger Vorfall von Extremitäten. In Betreff des ersten Punktes sind einige Autoren der Ansicht, man müsse das völlige Verstrichensein des Muttermundes abwarten, ehe man auch nur zu dem einfachsten Verfahren, der Reposition, greift. Dieser Ansicht steht z. B. Michaelis mit einigen Fällen aus seiner eigenen Praxis entgegen und auch in hiesiger Klinik ist bei noch nicht ganz verstrichenem Muttermund die Reposition vorgenommen worden (cf. ad I, Fall 1, 3, 4, 5, 8 u. 12). Ganz besonders aber muss man seine Aufmerksamkeit der Pulsation der Nabelschnur widmen. Pulsirt dieselbe bei nicht völlig verstrichenem Muttermund und Beweglichkeit des Kopfes auf dem Beckeneingang noch kräftig fort, so ist man sicher, dass das Leben des Kindes noch keine Gefahr erlitten hat; sowie aber die Schnur anfängt langsamer zu pulsiren, ist es Zeit einzuschreiten und zwar mit der Reposition. Denn durch die Reposition einer auch schwach pulsirenden oder seit kurzer Zeit erst pulslosen Nabelschnur erzielt man insofern ein günstiges Resultat, als durch Entfernung des Druckes die Pulsation eventuell sich

wiederherstellen kann. Natürlich ist die Operation so behutsam wie möglich vorzunehmen. Der Stand des Kopfes kommt insofern in Betracht, als man bei tiefstehendem Kopf und einigermaßen guten Wehen sofort zur Zange greift; steht derselbe dagegen hoch und beweglich oder ist er seitwärts abgewichen, so ist die Reposition stets zuerst auszuführen. Sollte sie auch nicht gleich gelingen, so muss sie wiederholt und durch gleichzeitiges Einstellen des Kopfes durch äussere Handgriffe angestrebt werden. Beckenenge oder Vorfall von Extremitäten indiciren nach Michaelis ebenfalls die Reposition, denn nach ihm führt dieselbe den Fall auf eine einfache Hinderung der Geburt durch Beckenenge event. Vorfall zurück.

Die Ausführung der Reposition kann nun auf zweierlei Weisen geschehen: manuell oder instrumentell. Hierin sind einzelne Autoren auch verschiedener Ansicht; in unseren Fällen ist stets manuell reponirt worden und zwar je nach den Umständen mit der halben oder ganzen Hand. Repositorien sind garnicht zur Anwendung gekommen.

Als weitere Mittel zur Lebensrettung des Kindes kommen Wendung mit nachfolgender Extraction oder sofortige Zangenapplication in Betracht. Ob man dem einen oder andern Verfahren den Vorzug geben soll, glaube ich, richtet sich ganz nach den obwaltenden Umständen; allgemeine Grundsätze hierfür aufzustellen, würde nicht thunlich sein. Einige Autoren geben nach misslungenem Repositionsversuch

der Wendung, andere der Zange den Vorzug; Schmidt geht sogar so weit, die Reposition gänzlich bei Seite zu lassen und sofort die Zange zu appliciren, er will durch dies Verfahren die günstigsten Resultate erzielt haben. Nach unserer Statistik ist der Wendung auf den Fuss mit nachfolgender Extraction vor der Zange der Vorzug gegeben worden und hat auch in den meisten Fällen günstigen Erfolg gehabt: denn von 17 misslungenen Repositionen sind von 8 Früchten 5 lebend durch die Wendung und von den übrigen 9 ist nur ein Kind durch die Zange lebend zur Welt gebracht worden. Anders ist es allerdings bei den übrigen 45 Fällen, in denen erst garnicht reponirt wurde; in 30 Fällen wurden nur 20 lebende Kinder durch die Wendung, von den übrigen 15 dagegen 11 lebend durch die Zange extrahirt worden.

Ausserdem sind in unserer Statistik nun noch 12 Fälle verzeichnet, in denen die Geburten mit Vorfall ganz der Natur überlassen sind. Die Resultate sind nicht günstig zu nennen, denn unter 12 sind nur 5 lebend geboren. Immerhin wird man in solchen Fällen erst berücksichtigen müssen die Pulsation der Nabelschnur, die Stärke der Wehen und ob das Becken geräumig genug ist; wenn man speciell diese und vielleicht hin und wieder noch andere eintretende Verhältnisse in Erwägung zieht, wird man stets bemessen können, wie weit man auf die Naturkraft zur Vollendung der Geburt zu rechnen hat.

Folgende 86 Fälle von Nabelschnurvorfall bei Kopflagen habe ich aus den geburtshülflichen Journalen der Greifswalder Klinik und Poliklinik vom 1. Januar 1858 bis zum 1. April 1881 herausgesucht. Die Reihenfolge ist je nach den Ergebnissen für das Kind aufgestellt worden.

I. Reposition

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend ?	Wie lange nach dem Geburts- beginn fiel die Nabelschnur vor?
1.	Frau S., 30 Jahre alt; von den 5 früheren Geburten waren 3 normal, bei 2 Wendung wegen Schulterlage.	VI para.	Vorfall einer 4—5" langen Schlinge in der linken Synchondrosis sacro-iliaca beim Blasensprung mit reichlichem Wasserabfluss.
2.	Frau M., 36 Jahre alt.	IV para.	Vorlagerung beim Einstellen der 2. Blase.
3.	Anna B., 30 Jahre alt.	III para.	Vorfall einige Stunden nach frühzeitigem Geburtsbeginn in der rechten Synchondrosis sacro-iliaca.
4.	Frau S., 40 Jahre alt; die früheren Geburten zwar langsam, aber normal verlaufen.	V para.	12 Stunden nach dem Geburtsbeginn beim Blasensprung in der linken Synchondrosis sacro-iliaca.
5.	?	Multipara.	Nicht angegeben. Vorfall an der vordern Beckenwand.
6.	Frau M., 31 Jahre alt.	IV para.	Vorfall bei b) gleichzeitig mit dem Blasensprung an der vordern Beckenwand.

bei Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter	b) für das Kind
Anfangs schwache Wehen, Kopf sehr beweglich, vergeblicher Repositionsversuch bei noch stehender Blase. Nach dem Blasensprung Kopf fest auf dem Beckeneingang; Reposition in der Narkose mit der halben Hand bei noch nicht ganz verstrichenem Muttermund.	Pulsation in der Wehenpause normal.	Günstig.	Lebensfrischer Knabe.
Gemini. Wehen fast gar nicht vorhanden, Kopf beweglich. Manuelle Reposition in den Eihäuten, darauf künstlicher Blasensprung.	Pulsation der Nabelschnur gut.	Günstig.	Lebendes Mädchen, + 3 Wochen später an Schwäche.
Schwache Wehen; Schiefelage des Uterus, Schräglage des Kindes, Hochstand und Abgewichenheit des Kopfes nach links, Einstellen durch äussere Handgriffe; beim künstlichen Blasensprung Vorfall, manuelle Reposition.	Die vorgefallene Schlinge pulsirte gut.	Normaler Verlauf des Wochenbetts.	Lebendes Mädchen.
Äusserst schmerzhaftes Wehen, Kopf nach rechts abgewichen, Einstellen desselben durch äussere Handgriffe. Manuelle Reposition in der Narkose.	Lebend.	Normaler Verlauf des Wochenbetts.	Lebendes Mädchen.
Manuelle Reposition bei noch nicht völlig verstrichenem Muttermund.	Regelmässige Pulsation.	Günstig.	Todter Knabe. (Todesursache nicht zu eruiren.)
Gemini. Bei b) manuelle Reposition bald nach dem Vorfall. Später Forceps wegen schwacher Wehen.	Nach der Reposition Foetalpuls allmählich immer langsamer.	Günstig.	Lebendes Mädchen.

I. Reposition

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Geburts- beginn fiel die Nabelschnur vor?
7.	Frau D., ?	Multipara.	Geburtsbeginn und Zeit des Vorfalles unbekannt. Vorfall an der vordern Beckenwand.
8.	Frau W., ? bei einer der früheren Geburten Wendung wegen Quer- lage.	III para.	Vorfall 2 Stunden nach dem Geburtsbeginn an der vordern Beckenwand.
9.	Frau B., 23 Jahre alt.	I para.	Prolaps bei b) beim Blasen- sprung an der vordern Becken- wand.
10.	Frau F., 32 Jahre alt.	X para.	Nicht angegeben. Vorfall an der vordern Becken- wand.
11.	Frau F., 38 Jahre alt.	IV para.	Geburtsbeginn und Zeit des Vorfalles unbekannt. Eine 8 cm. lange Schlinge an der vordern Beckenwand vorge- fallen.
12.	Johanna F., 37 Jahre alt; venter propendens; erste Geburt schnell und normal verlaufen.	II para.	Gleichzeitig mit dem künst- lichen Blasensprung an der rechten Synchondrosis sacro- iliaca.

i Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	Erfolg	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
Manuelle Reposition. Spontane Geburt.	Normale Pulsation.	Günstig.	Lebender Knabe.
Manuelle Reposition.	Anfangs 70 Schläge in der Minute, nach der Reposition 138.	Günstig.	Lebensfrischer Knabe.
Manuelle Reposition. Anhaltend schwache und unregelmässige Pulsation, Kopf fest auf dem Beckeneingang. Forceps wegen Wehenschwäche. Manuelle Lösung der Placenta.	Vor der Reposition schwache Pulsation, nach derselben normal.	Blutung in der Nachgeburtsperiode Wochenbett normal.	Lebendes Mädchen.
Manuelle Reposition. Während der manuellen Reposition verwandelte sich die Schädellage in 2. Ge- nts- lage, letztere durch Druck auf das Kinn wieder in Schädellage umgewandelt.	Normale Pulsation der Nabelschnur.	Günstig.	Lebendes Mädchen.
Manuelle Reposition mit der halben Hand.	Gute Pulsation.	Günstig.	Lebensfrischer Knabe.
Manuelle Reposition. Langsame Erweiterung des Geburtsmundes. Manuelle Reposition bei 2" weitem Geburtsmund, während des Verstreichen desselben; Forceps wegen Compression der Nabelschnur.	Nabelschnur anfangs gut pulsirend, später pulslos.	Wochenbett normal.	Leicht schein- todter Knabe, wiederbelebt.

II. Wendung und E.

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Gebur- beginn fiel die Nabelschnur vor?
1.	Johanna H., 27 Jahre alt; die erste Geburt langsam, doch ohne Kunsthülfe.	II para.	12 Stunden nach dem Gebur- beginn beim Blasensprung
2.	Johanna F., 28 Jahre alt. Lues.	II para.	Vorfall während der Wendung
3.	Johanna W., 27 Jahre alt; starker venter propendens.	II para.	24 Stunden nach dem Gebur- beginn beim künstlichen Bl- sensprung an der vorderen Beckenwand, geringer Wasser- abfluss.
4.	Fran W., 32 Jahre alt, enges Becken.	VI para.	Prolaps an der rechten Seite $\frac{1}{2}$ Stunde nach dem Gebur- beginn beim Blasensprung
5.	Frau G., 29 Jahre alt; sehr starker venter propendens; die früheren Geburten leicht verlaufen.	III para.	Vorfall rechts vorn bald nach dem Geburtsbeginn beim Bl- sensprung.
6.	Frau P., 28 Jahre alt; die früheren Geburten ohne Kunsthülfe, doch immer sehr langsam; nach der 3. Geburt litt sie an Polyarthritiserheumatismatica. Das 3. Kind 6 Wochen zu früh geboren.	IV para.	Vorfall hinter dem rechten horizontalen Schambeinast bald nach dem Geburtsbeginn beim Blasensprung mit sehr reich- lichem Wasserabfluss.

action bei Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	Erfolg	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
längs sehr schwache hen. Vorliegen der Na- schnur, Kopf links ab- weichen, nach der Wen- g vollständiger Prolaps vor die äussern Ge- schlechtstheile.	Normale Pulsation.	Heftige Blutung in der Nachge- burtsperiode Wochenbett normal.	Lebendes Mädchen.
osition der linken Hand. fall bis vor die äussern Geschlechtstheile.	Unregelmässige Pulsation der Nabel- schnur.	Im Anfang des Wochen- betts Peri- metritis.	Lebender Knabe; Blen- norrhoea neonator.
hstand des Kopfes, Vor- en einer Hand an der tern Beckenwand, starke traction des Uterus, rend der Wendung Vor- bis vor die äussern chlechtstheile; die sehr ge Nabelschnur zeigte nen wahren Knöten.	Gute Pulsation.	Günstig.	Lebendes Mädchen.
ftige Wehen; Vorliegen der Füsse; Kopf links abgewichen, 1 mal vergeb- es Anlegen der Zange; f durch modificirten ellie-Weit entwickelt.	Compression der Na- belschnur während der Wendung, dar- auf gleich pulslos.	Günstig. Wochenbett normal.	Tief asphyk- tisches Mäd- chen, nicht wiederbelebt
eflage des Uterus, Kopf s abgewichen; Lösung rechten Armes schwie- tiefer Sitz der Placenta.	Anfangs gute Pul- sation, später 90 Schläge in der Mi- nute.	Mässige Blu- tung in der Nachgeburts- periode; sonst günstig	Mädchen leichtschein- todt, wieder- belebt; frac- tura humeri im obern Drittel.
hstand des Kopfes. Nach m misslungenen Repo- nsversuch Kopf fest auf Beckeneingang. Pla- a praevia mit Insertio marginalis.	Gute Pulsation.	Günstig. Wochenbett normal.	Lebender Knabe.

II. Wendung und B

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Gebu- beginn fiel die Nabelschnur
7.	Frau L., 43 Jahre alt; bei der Geburt des 2., 3., 4., 5. und 6. Kindes Wendung, beim 3. und 6. Zange an den nach- folgenden Kopf (alle toddgeboren); das 7. Kind faul tott ausge- stossen.	IX para	Nicht angegeben.
8.	Frau St., 38 Jahre alt; gesunde, kräftige Per- son; die früheren Ge- burten von langer Dau- er; enges Becken und zwar der linke Becken- raum enger als der rechte. Das 2. und 4. Kind kurz nach der Ge- burt gestorben, das 3. zu früh geboren.	V para.	Vorfall 5 Stunden nach Geburtsbeginn beim Bla- sprung an der linken Bec- seite.
9.	Frau E., 26 Jahre alt; enges Becken, Conj. diag. = 4" 2—3"; bei der 1. Geburt Zange, bei der 2. (Schulterlage) Wendung u. Extraction mit der Zange, bei der 3. (Gemini) bei b) Wen- dung auf die Füße.	IV. para.	Prolaps rechts vorn und re- hinten 10 Stunden nach Geburtsbeginn beim Bla- sprung.
10.	Frau P., 32 J. alt; die früheren Geburten nor- mal verlaufen.	III para.	Vorfall links vorn bei nicht verstrichenem Mu- mund 5 Stunden nach dem burtsbeginn beim Blasenspr

traction bei Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
Vorfall des linken Armes bis in die vagina; Kopf stark links abgewichen; Nabelschnur quer über den Kopf gespannt. Uterus schlaff. Wendung schwierig, da sich das linke Knie vorne aufstemmte. Kopf durch modificirten Smellie entwickelt.	Vorzeitige Athem- bewegungen, de- halb schnelle Ex- traction.	Günstig.	Lebendes Mädchen.
Wehen nach dem Blasen- sprung sehr schwach; Kopf rechts abgewichen; Vorfall bis in die Scheide; innerer Muttermund unnachgiebig; zwei vergebliche Wendungs- versuche, dritte Wendung erlang, vergebliches An- legen der Zange an den nachfolgenden Kopf; Lösung der Arme schwierig; Ex- traction des Kopfes durch kräftigen Zug am Kinn.	Nabelschnur pulsirte nur noch wenige Minuten nach dem Blasen- sprung.	Nichts angegeben.	Todter Knabe.
Hochstand und Abgewichen- sein des Kopfes; vergeb- licher Repositionsversuch. Cephalotribe.	Compression der Nabelschnur nach der Wendung beim Einschneiden des Steisses.	Im Wochen- bett Endo- metritis.	Knabe + während der Geburt. Kind 10 Pfd. schwer, " 21 1/2 " lang, Kopfumfang 38 1/2 cm.
Hochstand des Kopfes; schwache, aber regelmässige Wehen.	Anfangs gute Pul- sation, jedoch rea- girte das Kind nach der Wendung nicht mehr auf äussere Reize, deshalb schnelle Extraction.	Günstig. Wochenbett normal.	Tief asphyk- tischer Kna- be, wieder- belebt.

II. Wendung und Ex

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Geburt- beginn fiel die Nabelschnur vor?
11.	Frau B., frühere Ge- burten stets leicht.	XII para.	Vorfall an der vordern Becken- wand 5 Stunden nach dem Ge- burtsbeginn beim Blasensprung mit reichlichem Wasserabfluss.
12.	Frau F., 25 J. alt; bei den letzten beiden Ge- burten Zange.	IV para.	Geburtsbeginn nicht angege- ben. Gleichzeitig mit dem Blasensprung.
13.	Frau W., 24 J. alt; die früheren Geburten nor- mal verlaufen.	III para.	Vorfall an der vordern Becken- wand während der Repositio- des linken Arms bis vor die äussern Geschlechtstheile.
14.	Frau Sp., 37 J. alt; die früheren Geburten nor- mal verlaufen.	VII para.	Beim Blasensprung an der hin- tern Beckenwand.
15.	Frau Z., 23 J. alt.	II para.	Beim Blasensprung an der lin- ken Beckenseite.
16.	Milana L., 25 J. alt.	I para. ?	Nicht angegeben.
17.	Frau T., 32 J. alt.	III para.	Nicht angegeben. Vorfall a- der hintern Beckenwand.
18.	Frau B.	XII para.	Frühzeitiger Blasensprung; Zeit nicht angegeben; Vorfa- ll vorn rechts.

action bei Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	Erfolg	
		a) für die Mutter	b) für das Kind
Vorfall der linken Hand an vordern Beckenwand; Kopf rechts abgewichen. Nach dem Blasensprung schwache, aber regelmässige Wehen.	Gute Pulsation.	Günstig.	Leicht scheintodter Knabe, wiederbelebt.
Kopf beweglich, Nabelnur bis vor die äussern schlechtstheile vorgeschoben, manuelle Lösung der Placenta.	Nabelschnur pulsirte anfangs normal, nach der Wendung schwächer.	Heftige Blutung in der Nachgeburtsperiode Wochenbett normal.	Todter Knabe.
Vorfall des linken Armes und Fusses an derselben Stelle; Kopf rechts abgewichen. Wendung vermittelt des doppelten Handgriffs.	Nichts angegeben.	Leichte Endometritis im Wochenbett.	Tief scheintodtes Mädchen, nicht wiederbelebt.
Sehr schwache Wehen. Vorfall des linken Armes an vordern Beckenwand.	Während der Operation unregelmässige Pulsation.	Günstig.	Leicht scheintodter Knabe, wiederbelebt.
Kopf beweglich auf dem Kinneneingang; Reposition Lagerung vergeblich. Nabelschnur sehr lang.	Nach der Wendung unregelmässige Pulsation.	Günstig.	Leicht scheintodter Knabe, wiederbelebt.
Liegen der Nabelschnur; Kopf fest auf dem Beckeneingang; misslungener Repositionsversuch.	70 Schläge in der Minute.	Wochenbett normal.	Todter Knabe.
Vorfall bis vor die vulva Umlagern auf das Geburtsbett, Nabelschnur sehr lang.	Sehr schwache Pulsation (40 Schläge in der Wehenpause), nach dem Umlagern pulslos.	Günstig.	Tief scheintodter Knabe, nach 20 Minuten wiederbelebt.
Kopf beweglich auf der Apertur, Vorfall des rechten Fusses.	Pulsation hört während der Operation auf.	Günstig. Wochenbett normal.	Todtes Mädchen.

II. Wendung und Ex

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Geburt beginn fiel die Nabelschnur vo
19.	Frau M., 42 J. alt.	XI para.	Nicht angegeben.
20.	Frau Br., 26 J. alt.	III para.	Vorfall in der Beckenhöh beim Blasensprung.
21.	Frau B., 34 J. alt; die früheren Geburten nor- mal.	IV para.	Vorfall an der vordern Becken- wand bei Reposition des rec ten Arms.
22.	Frau W., 32 J. alt; die früheren Geburten schwer verlaufen, schräg verengtes Becken; bei der 1. Geburt Zange (Kind †), bei der 2. Ge- burt Steisslage (Kind † während der Geburt), bei der 3. Schädellage Per- foration, bei der 4. Schä- dellage Perforation u. Cephalotripsie.	VII para.	Vorfall während der Wendung
23.	Frau B., 33 J. alt; die früheren Geburten leicht verlaufen; stark geneig- tes Becken.	VII para.	Verfall an der rechten Sy- chondrosis sacro-iliaca 5 Stu- den nach dem Geburtsbegi nach dem Blasensprung n reichlichem Wasserabfluss
24.	Frau W., 23 J. alt; bei der 1. Geburt bei Schä- dellage wegen Nabel- schnurvorfall Zange; 2. Geburt normal ohne Kunsthülfe.	III para.	Nicht genau angegeben.

raction bei Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation	E r f o l g	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
hr reichlicher Wasserab- ss; Kopf nach vorn ab- gewichen.	Schwache Pulsation.	Günstig.	Scheintodtes Mädchen, wieder- belebt.
ch dem Blasensprung llständiges Aufhören der ehen, nach der Wendung erke Contraction des Mut- termundes; frühzeitige Lö- sung der Placenta.	Gute Pulsation.	Günstig. Leichter Dammriss.	Knabe, starb bald nach der Geburt.
opf nach links und vorn gewichen; Placenta prae- lateralis; Eihautriss ht am Rande der Pla- centa.	Pulsation normal.	Günstig. Wochenbett normal.	Lebender Knabe.
ampf des Muttermundes. rceps an den nachfolgen- n Kopf, Schluss derselben schwierig.	Allmählich lang- samere Pulsation.	Günstig.	Knabe, starb während der Geburt.
ch der Wendung sehr awache Wehen; Lösung s rechten Arms schwierig. belschnur sehr lang, bis die Geschlechtstheile vor- gefallen.	Nach der Wendung sehr schwache Pul- sation; starker Ab- gang von Meconi- um; zuckende Be- wegungen der Ex- tremitäten.	Günstig. Wochenbett normal.	Tief asphyk- tisches Mäd- chen, wieder- belebt.
nstlicher Blasensprung. rfall beider Arme; For- s an den nachfolgenden Kopf.	Gute Pulsation.	Endo- und Perimetritis im Wochenbett.	Knabe, † 14 Tage nach der Geburt. Infraction der clavicula dextra im äussern Drittel.

II. Wendung und E

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Gebur- beginn fiel die Nabelschnur y.
25.	Frau P., 45 J. alt; die früheren Geburten dau- erten alle lange.	IX para.	Nicht genau angegeben. V fall rechts hinten, Schlin links hinten wieder in die Hö
26.	Bertha B., 26 J. alt; enges Becken, Conj. int. 3 $\frac{1}{4}$ "; sonstkräftige Per- son; die 1. Geburt sehr lang, Kind todtgeboren.	II para.	Vorfall während der Wendu
27.	Frau K., 41 J. alt.	XII para.	Vorfall an der vordern Becke wand beim künstlichen Blase sprung bei b).
28.	Louise S., 42 J. alt; die früheren Geburten nor- mal.	III para.	Vorfall 4 Stunden nach d Geburtsbeginn beim Blase sprung.
29.	Frau L., 23 J. alt; 2 Geburten normal, beider 3. manuelle Lösung der Placenta.	IV para.	Prolaps während der Wendu
30.	Frau A., 34 J. alt; die früheren Geburten normal.	VIII para.	Während der Wendung Blase sprung.
31.	Frau L., 25 J. alt.	II para.	Beim Blasensprung.
32.	Frau L., 40 J. alt; 2 mal Frühgebur.	VI para.	Vorfall beim Blasensprung
33.	Frau W., 28 J. alt; star- ker venter propendens, leicht verengtes Becken; letzte Geburt schwer.	IV para.	Frühzeitiger Wasserabfluss Vorfall an der vordern Beck wand.

action bei Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter	b) für das Kind
Hochstand des Kopfes. Misslungener Repositions- versuch. Kopf nach Smellie- Veit.	Anfangs 142 Schläge in der Minute, spä- ter 82.	Günstig.	Tiefscheintodter Knabe, wie- derbelebt.
Kopf durch modificirten Smellie entwickelt.	Gute Pulsation.	Litt an leich- ter Perime- tritis.	Lebendes Mädchen.
mini. Bei b) Kopf links abgewichen. Vorfall der rechten Hand.	Frequenz normal.	Günstig.	6 Wochen zu früh gebore- ner todter Knabe.
Kopf links abgewichen.	Langsamer Puls.	Günstig.	Lebender Knabe.
Kopf links abgewichen.	Pulsation schwach.	Günstig.	Lebendes Mädchen.
Position anfangs gelun- gen, trotzdem wieder Vor- fall; sehr schwache Wehen. centa praevia lateralis.	Gute Pulsation der Nabelschnur.	Blutung in der Nach- geburtspе- riode; sonst günstig.	Lebens- frisches Mädchen.
Operation vergeblich. Lö- sung der Arme.	Normale Pulsation.	Günstig.	Lebender Knabe.
Sehr schwache Wehen.	Puls sehr schwach.	Günstig.	Knabe lebte wenige Minuten; Frühgeburt.
mini. Bei a) misslungener Repositionsversuch. Vor- fall einer Hand; während Wendung Inspirations- bewegungen.	Schwache Pulsation in d. Wehenpause.	Günstig.	Leicht scheintodter Knabe, be- lebt, † 2Tage nach der Ge- burt.

II. Wendung und E.

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Gebur- beginn fiel die Nabelschnur v.
34.	Frau S., 32 J. alt.	VI para.	Beim Blasensprung.
35.	Frau H., 27 J. alt.	II para.	Nicht angegeben. Vorfall einer 9 cm. langen Schli- vor dem Gesicht.
36.	Caroline R., 23 J. alt.	I para.	Zeit unbekannt; Vorfall ei- langen Schlinge an der hint- Beckenwand.
37.	Frau St.	V para.	Nicht angegeben. Vorfall hin- der Symphyse.
38.	Minna S., 23 J. alt.	I para.	Bei b) Vorfall beim Blas- sprung an der vordern Beck- wand.

III. Forceps b

1.	Auguste F., 21 J. alt.	I para.	Vorfall bei a) an der vord- Beckenwand beim künstlic- Blasensprung.
2.	Christine C., 37 J. alt; die früheren Geburten bis zum Blasensprung sehr lang dauernd.	IV para.	Vorfall in der rechten S- chondrosis sacroiliaca bei Blasensprung mit reichlich Wasserabfluss.

raction bei Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
Gesichtslage. Kopf-etwas abgewichen. Vorliegen einer Hand.	Zuletzt unregel- mässige Pulsation, deshalb schnelle Extraction.	Günstig.	Lebender Knabe.
Gesichtslage; schwache Wehen.	Frequenz normal.	Günstig.	Lebens- frisches Mädchen.
Kopf leicht beweglich über dem Beckeneingang.	Gute Pulsation.	Günstig.	Leicht scheintodtes Mädchen. wiederbelebt
Nichts angegeben.	Normale Pulsation.	Günstig.	Lebendes Mädchen.
emini. Vergeblicher Re- spositionsversuch; Schlinge bis in die äussern Ge- blechtstheile vorgefallen.	Puls normal.	Günstig.	Lebendes Mädchen, Frühgeburt im 9. Monat.

Kopflagen.

emini. 24 Stunden hin- durch schwache Wehen.	Schwache Pulsation der Nabelschnur, so- fort Extraction.	Heftiger Schüttelfrost im Wochen- bett.	Schwacher, 4 Wochen zu früh gebore- ner Knabe.
Anfangs hoher Kopfstand, position misslang, Vor- fallen einer grössern Schlinge; Kopf dann fest auf dem Beckeneingang; schwache Contraction des Uterus, Wehenanregung durch Secal. cornut; 1 ver- geblicher Zangenversuch.	Pulsation nimmt all- mählich ab, nach dem 1. Zangenver- such Nabelschnur pulslos.	Günstig.	Todter Knabe, sehr stark entwickelt.

III. Forceps be

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Geburt- beginn fiel die Nabelschnur vo
3.	Minna L., 20 J. alt; von kleiner Statur; starke Beckenneigung.	I para.	10 Stunden nach dem Geburt- beginn beim Blasensprung: der vordern Beckenwand.
4.	Karoline E., 23 J. alt.	II para.	Frühzeitiger Geburtsbeginn 30 Stunden später Vorfall a der vordern und hintern Becke wand beim künstlichen Blase sprung mit reichlichem Wasse abfluss.
5.	Johanna E., 26 J. alt.	II para.	Frühzeitiger Abfluss des Fruch wassers ohne Wehen; Vorfa an der hintern linken Becke wand einige Stunden nach de Beginn.
6.	Wilhelmine K., 24 J. alt.	I para.	Vorfall einige Zeit nach de Blasensprung hinten links.
7.	Wilhelmine St., 27 J. alt.	II para.	Früher Geburtsbeginn; Vorfa an der hintern Beckenwar beim Blasensprung.
8.	Marie K., 36 J. alt.	V para.	Frühzeitiger Fruchtwasser abfluss; 2 Schlingen quer üb dem Muttermund.
9.	Friederike P., 26 J. alt.	III para.	Einige Stunden nach dem G burtsgeninn beim Blasensprun

opflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
fangs Kopf beweglich auf Beckeneingang, zwischen ihm und Blase viel Fruchtwasser, Wehen normal, beim Blasensprung festes Einstellen des Kopfes.	Keine Pulsationen.	Günstig.	Todter Knabe.
ndus stark nach rechts neigt, deshalb Lagerung; viel Fruchtwasser zwischen Kopf und Blase, deshalb engen derselben; Vorfall tief in die Scheide; Operation misslang; starke Contraction des Uterus.	Anfangs 116 Schläge in der Minute, allmählich schwächere Pulsation.	Günstig.	Lebendes Mädchen. Blennorrhoea neonator.
ngsame Eröffnung des Muttermunds bei schwachen Wehen; Hochstand und Abwischensein des Kopfes; lange bei noch nicht vertrichenem Muttermund.	Regelmässige Pulsation der Nabelschnur.	Günstig.	Leicht scheinodtes Mädchen, wiederbelebt
ngsame Erweiterung des Muttermundes; Vorfall bis die äusseren Genitalien; lange im queren Durchmesser. Einmal um den Hals geschlungen.	Zuletzt keine Pulsationen an der Nabelschnur fühlbar.	Wochenbett normal.	Todtes Mädchen.
awache Wehen; Hochstand des Kopfes; vorliegende Schnur schon in der Blase deutlich zu fühlen.	Pulsationen wurden beim Tiefertreten des Kopfes unregelmässig.	Günstig.	Lebender Knabe.
Hoher Kopfstand.	Nach der Umlagerung keine Pulsationen fühlbar, deshalb sofort Zange.	Wöchnerin litt an Haematoceleretrouterina.	Knabe starb bald nach der Geburt.
rfall des rechten Arms. Einmal um den Hals geschlungen.	In der Wehenpause 120 Schläge in der Minute; beim Tiefertreten des Kopfes 84.	Peritonitis puerperalis, † 14 Tage post partum.	Lebendes Mädchen.

III. Forceps b

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Gebur- beginn fiel die Nabelschnur v
10.	Henriette Z., 26 J. alt.	III para.	Vorfall beim Blasensprung
11.	Frau K., 28 J. alt.	I para.	Einige Stunden nach dem G- burtsbeginn beim Blasensprung
12.	Frau V., 39 J. alt.	VIII para.	Nicht angegeben.
13.	Frau B., 37 J. alt.	VII para.	Nicht angegeben.
14.	Frau P., 24 J. alt; die früheren Geburten leicht.	III para.	3 Stunden nach dem Gebur- beginn beim künstlichen Blasensprung an der hint- Beckenwand, 1 Schlinge vor- vorgefallen.
15.	Johanna K., 34 J. alt; venter propendens.	II para.	Bei b) beim Blasensprung der vordern Beckenwand

opflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
f tief im kleinen Becken, ge ohne Narkose; In- io marginalis der 62 . langen Nabelschnur.	Sehr schwache Pul- sation.	Parametritis mit Exsudat- bildung.	Scheintodter Knabe, wie- derbelebt.
Ende der Schwanger- ft häufig Blutungen; licher Fruchtwasserab- s mit Tiefertreten des fes. Zange bei fast ver- ehenem Muttermund 2 mal erfolglos angelegt; ndem der Kopf vorher der Hand gedreht wor- war, zum 3. mal Zange nach vorn gerichteter ser Fontanelle in der genhöhle. Placentaprae- centralis mit Insertio marginalis.	80 Schläge in der Minute, allmählich immer schwächer werdend.	Leichter Dammriss, Wochenbett normal	Todter Kna- be, 6 Wochen zu früh ge- boren.
ärztliche Hülfe zur le kam, war der Kopf its in der Beckenhöhle, traction sehr schnell vollendet.	Keine Pulsation.	Günstig.	Todter Knabe.
Schwache Wehen.	Beim Einschnneiden des Kopfes Com- pressions- erscheinungen.	Günstig.	Lebender Knabe.
en Eihäuten schon Vor- gen der Nabelschnur.	Anfangs 148 Schläge in der Minute, später schwächer, in Folge des Drucks.	Günstig.	Scheintodtes Mädchen, wiederbelebt
ini. Vorfall bis in die ide; Kopf fest auf der obern Apertur.	Nach dem Blasen- sprung keine Pul- sation.	Günstig.	Lebendes Mädchen.

III. Forceps II

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Gebur- beginn fiel die Nabelschnur v
16.	Frau K., 38 Jahre alt; einmal Abortus.	XI para.	Nicht angegeben. Vorfall hinter der Symphy
17.	Frau W., 35 Jahre alt; bei der ersten Geburt Zange, zweite normal.	III para.	12 Stunden nach dem Gebur- beginn beim Blasensprung Schleichender Fruchtwasser fluss.
18.	Frau B., 40 Jahre alt; kräftige Person, rechts- seitige Hernie; 5 der früheren Geburten schwierig (3 todt, 2 le- bend), bei der andern die Frucht faultodt.	VII para.	Frühzeitiger Fruchtwasser fluss. Vorfall einige Stun- nach dem Blasensprung w rend sehr kräftiger Wehe
19.	Frau S., ?	IV para.	Vorfall an der rechten S chondrosis sacro-iliaca bei f zeitigem Blasensprung.
20.	Frau A., 31 Jahre alt.	I para.	Frühzeitiger und reichlich Fruchtwasserabfluss; Zeit bekannt. Vorfall rechts v
21.	Friederike K., 29 Jahre alt; die früheren Ge- burten ohne Kunsthülfe.	III para.	Vorfall 14 Stunden nach Geburtsbeginn beim künstlich Blasensprung.

opflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	Erfolg	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
mini. Bei b) Vorfall der Arme. Die Repo- n gelang zuerst, jedoch die Schnur wieder vor; ndungsversuch misslang. efer Sitz der Placenta.	64 Schläge in der Minute.	Günstig. Blutungen in der Nach- geburts- periode.	Tiefschein- todtes Mäd- chen, nicht belebt.
nfangs sehr schwache hen. Kopf fest auf dem ekeneingang, Querstand Pfeilnaht; Reposition geblich. Placenta prae- via lateralis.	Normale Pulsation.	Starke Blu- tung gleich nach der Ge- burt. Starb eine halbe Stunde post partum, laut Sectionspro- tokoll wahr- scheinlich durch Herz- paralyse.	Knabe, † während der Geburt.
rvortreten der Hernie. of rechts abgewichen. fall bis vor die äussern Geschlechtsteile.	Pulslose Nabel- schnur.	Günstig.	Lebender Knabe.
her Kopfstand; 2 Repo- nsversuche, jedoch im- e wieder Vorfall; 1 ver- licher Zangenversuch, ge nicht zu schliessen; nuelle Lösung der Pla- centa.	Unregelmässige Pulsation nach dem ersten Repositions- versuch.	Heftige Blu- tung gleich nach der Ge- burt, Damm- riss, Wochen- bett normal.	Mädchen, † unter der Geburt.
angs schwache Wehen; ergebliche Repositions- versuche.	Nach dem ersten Repositionsversuch hörte die Pulsation ganz auf.	Günstig.	Todtes Mädchen.
chwache Wehen; Kopf ts abgewichen, stellt nach der Lagerung den Beckeneingang; termund noch nicht ver- strichen.	Normal.	An Parame- tritis exsu- dativa be- handelt.	Lebendes Mädchen.

III. Forceps U

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Gebu- beginn fiel die Nabelschnur v
22.	Frau G., 30 Jahre alt; die 1. Geburt normal.	II para.	6 Stunden nach dem Gebu- beginn der Blasensprung. belschnur, 2 mal quer ü den Muttermund gespannt, l labirt erst nach einem W dungsversuch.
23.	Johanna K., 22 Jahre alt; Rhachitis oder Scro- phulose?	I para.	Frühzeitiger Geburtsbeginn Vorfall beim Blasensprung der rechten Synchondrosis cro-iliaca.
24.	Frau S., 34 Jahre alt.	IX para.	Nicht angegeben. Vorfall hinter der Symphy

IV. Spontane Au

1.	Frau P., 33 Jahre alt.	III para.	Vorfall 10 Stunden nach o frühzeitigen Fruchtwasser fluss beim Herabtreten Kopfes an der vordern Beck wand.
2.	Frau V., 36 Jahre alt; diese Geburt partus prae- cipitatus.	III para.	Vorfall gleichzeitig mit geborenen Kopf.
3.	Frau L., 32 Jahre alt; starke Beckenneigung; die früheren Geburten normal.	VII para.	Vorfall an der hintern Beck wand beim Blasensprung noch nicht ganz verstrichen Muttermund und reichliche Fruchtwasserabfluss.

Kopflagen.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter	b) für das Kind
Vendung vergeblich. Feste Contraction des Uterus, Kopf fest auf dem Becken.	Nach dem Wendungsversuch hört die Pulsation auf.	Günstig.	Scheintodtes Mädchen, wiederbelebt.
Schwache Wehen; Hochstand des Kopfes. Pfeilhaut im queren Durchmesser.	Allmählich pulslose Nabelschnur.	Günstig.	Tiefscheintodter Knabe, nicht wiederbelebt.
Vorfall des linken Arms und rechten Fusses, beide reponirt; Reposition der Nabelschnur vergeblich.	70 Schläge in der Minute.	Günstig.	Tiefscheintodtes Mädchen, nicht belebt.

Lossung der Frucht.

Unregelmässige, schmerzhafte Wehen; Vorliegen einer Hand, die nach dem Tode des Foetus reponirt wurde.	Anfangs normale Pulsation.	Günstig.	Foetus starb vor der Reposition ab.
Seit 14 Tagen Wehenartige Schmerzen.	Normal.	Wochenbett normal.	Lebender Knabe.
Hocher Kopfstand. Vorfall einer Hand.	Pulslos beim Herabtreten des Kopfes.	Günstig.	Scheintodter Knabe, belebt, $\frac{1}{2}$ 6 Tage post partum an Trismus.

IV. Spontane Aus

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Geburt beginn fiel die Nabelschnur vor
4.	Frau B., 32 Jahre alt; die früheren Geburten normal.	IV para.	Vorfall hinter dem linken hor- zontalen Schambeinast ku- nach dem Beginn beim Blase- sprung.
5.	Frau L., 32 Jahre alt; die früheren Geburten dauerten wegen mangel- hafter Wehen sehr lange.	III para.	Bei b) Vorfall beim künstliche Blasensprung mit reichliche Wasserabfluss.
6.	Frau G.	III para.	Unbekannt. Vorfall an d- rechten Seite.
7.	Frau T., 37 Jahre alt.	III para.	Unbekannt.
8.	Frau F., 35 Jahre alt; die letzte Geburt sehr schnell verlaufen.	V para.	Nicht angegeben.
9.	Frau B., 37 Jahre alt; hat einmal bereits Zwillinge geboren.	X para.	Vorfall bei b) beim Blase- sprung.

tossung der Frucht.

Besondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	Erfolg	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
ergeblicher Repositions- ersuch. Krampf des innern Muttermundes.	Kurze Zeit nach dem Blasensprung noch gute Pulsation, dann durch Druck des Kopfes während der Wehe pulslos; ausser der Wehe wieder pul- sirend, hörte die Circulation einige Stunden nach dem Beginn ganz auf.	Günstig.	Todtes Mädchen.
emini. Nabelschnur bis vor die äussern Geschlechts- theile vorgefallen.	Die Pulsationen hörten allmählich auf.	Günstig.	Tiefschein- todter Knabe, nicht belebt.
Nichts angegeben.	Nabelschnur pulslos.	Günstig.	Todtes Mädchen.
nach dem Vorfall sofortige Vollendung der Geburt. Nabelschnur einmal um den Hals geschlungen.	Nichts angegeben.	Günstig.	Todter Knabe. (Nach Anga- be der Mut- ter wahr- scheinlich in Folge eines Falles zwei Tage vor der Geburt.)
ehr kräftige Wehen; Na- belschnur bis vor die äussern Geschlechtstheile gefallen; manuelle Lösung der Pla- centa.	Entleerung von viel Meconium.	Günstig.	Lebender Knabe.
emini. Wehen anfangs schwach. Vorfall einer Hand.	Nabelschnur pulsirte in der We- henpause gut.	Günstig.	Lebender Knabe.

IV. Spontane Aus

No.	Körper- und Becken- verhältnisse.	Wieviel- gebärend?	Wie lange nach dem Geburt- beginn fiel die Nabelschnur vor
10.	Frau R., 39 Jahre alt.	VIII para.	Vorfall beim Blasensprung der rechten Hüftkreuzbeinfuge
11.	Frau B., 31 Jahre alt; frühere Geburten normal.	IV para.	Vorfall 4 Stunden nach de Geburtsbeginn beim Blasen- sprung.
12.	Karoline H., 24 Jahre alt.	II para.	Vorfall rechts hinten bei Blasensprung 24 Stunden nac dem Geburtsbeginn.

ssung der Frucht.

sondere Umstände.	Zustand des Kindes vor und während der Operation.	E r f o l g	
		a) für die Mutter.	b) für das Kind.
Wehen gut.	Keine Compression.	Günstig.	Leicht scheintodter Knabe, wie- derbelebt.
ebliches Anlegen der age in der Narkose.	50—60 Schläge in der Wehenpause, allmähliches Auf- hören der Pulsation.	Günstig.	Todter Knabe.
kräftige Wehen; Vor- bis in die äussern Ge- echtstheile; Tiefer Sitz der Placenta.	Keine fühlbaren Pulsationen.	Günstig.	Scheintodter Knabe, wie- derbelebt.

Unter den genannten 86 Fällen von Nabelschnurvorfall bei Kopflagen war 53 mal der Erfolg für das Kind ein günstiger; es wurden demnach gerettet 64 %

1. Die Reposition wurde 12 mal ausgeführt, hiervon wurden todtgeboren 1; die Procentzahl der Lebenden demnach . . . 92 %

2. Die Wendung und Extraction wurde 38 mal vorgenommen; 25 Kinder lebend geboren, also 66 %

3. Die Zange wurde 24 mal applicirt, und rechnet man die unter Reposition angeführten Fälle Nr. 6 u. 12 hinzu, so 26-mal. Todt wurden zur Welt gefördert 12, demnach blieben am Leben 58 %

4. Spontan ausgestossen wurden 12, hiervon 7 todtgeboren, demnach lebend geboren 42 %

5. In 30 Fällen wurde ohne vorher zu reponiren sofort die Wendung gemacht; hiervon 20 lebend geboren 67 %

6. In 15 Fällen wurden ohne vorhergegangenen Repositionsversush sofort die Zange applicirt; hiervon 11 lebend geboren 74 %

Mütterlicherseits sind 2 Todesfälle bei der Entbindung mit der Zangē vorgekommen; in dem einen litt die Wöchnerin an Peritonitis puerperalis und starb 14 Tage post partum; in dem zweiten Fall starb die Betreffende $\frac{1}{2}$ Stunde post partum laut

Sectionsprotokoll wahrscheinlich durch Herzparalyse in Folge heftiger Blutung während und gleich nach der Geburt.

Betrachten wir die oben angeführten Zahlen, so ist bei jedem Nabelschnurvorfalle, wenn irgend thunlich, Kunsthülfe erforderlich. Dass die zur rechten Zeit ausgeführte Reposition die günstigsten Resultate liefert, ergibt obiger Procentsatz der dabei lebend geborenen Kinder.

Lebenslauf.

Heinrich Karl Gotthold Imanuel Schaefer, geboren am 16. Januar 1857 zu Neuendorf bei Potsdam, Sohn des Pfarrers Imanuel Schaefer und dessen Ehefrau Marie geb. Koenig, erhielt seinen ersten Schulunterricht in der Elementarschule zu Guttstadt in Ostpreussen, wohin sein Vater Sommer 1858 versetzt worden war. Dann durch Privatstunden weiter vorbereitet, besuchte er von Michaelis 1869 bis Ostern 1870 das Königl. Friedrichscollegium zu Königsberg in Ostpr. Von Ostern 1870 ab besuchte er, um in der Nähe seines Elternhauses zu Blumenau, Kr. Preuss. Holland in Ostpr., zu sein, das Gymnasium zu Elbing und erwarb sich daselbst am 3. März 1877 das Zeugniß der Reife. Am 17. April h. a. wurde er in Greifswald unter dem Rectorate des Herrn Prof. Dr. Mosler als studiosus medicinae immatrikulirt, bestand daselbst am 12. Mai 1880 das tentamen physicum und am 25. Februar 1881 das examen rigorosum.

Während seiner Studienzeit in Greifswald besuchte er die Vorlesungen und Kliniken folgender Herren Professoren und Docenten:

Prof. Dr. Arndt: Encyklopädie und Methodologie der Medicin. Psychiatrie.

Geh. Med.-Rath Prof. Dr. Budge: Systematische Anatomie. Anatomie der Sinnesorgane. Präparirübungen.

Dr. Budge: Osteologie und Syndesmologie. Mikroskopischer Coursus.

Prof. Dr. Frhr. v. Feilitzsch: Experimentalphysik. I. und II. Wärmelehre.

- Prof. Dr. Landois: Experimentalphysiologie. I. und II. Entwicklungsgeschichte und Zeugungslehre. Physiologischer Cursus.
- Prof. Dr. Sommer: Histologie und mikroskopische Anatomie. Lage der Eingeweide
- Prof. Dr. Limpricht: Chemie. Chemisches Practicum.
- Prof. Dr. Münter: Allgemeine Botanik.
- Prof. Dr. Mosler: Specielle Pathologie und Therapie. I. und II. Physikalische Diagnostik. Nierenkrankheiten. Kehlkopfkrankheiten. Medizinische Klinik.
- Prof. Dr. Eulenburg: Specielle Arzneimittellehre. Arzneiverordnungslehre. Electrotherapie.
- Prof. Dr. Eichstedt: Syphilis.
- Prof. Dr. Hueter: Chirurgische Operationslehre. Allgemeine Chirurgie. Chirurgische Diagnostik. Chirurgische Klinik. Operationen am Kopf. Knochenkrankheiten. Resectionen und Amputationen. Operations-Cursus.
- Prof. Dr. Vogt: Specielle Chirurgie. I. und II. Orthopaedie.
- Prof. Dr. Schüller: Verband- und Instrumentenlehre. Chirurgie der Geschwülste. Operationscursus.
- Geh. Medic.-Rath Prof. Dr. Pernice: Theorie der Geburtshülfe. Krankheiten der Neugeborenen. Geburtshülfliche Klinik. Geburtshülfliche Operationen.
- Dr. v. Preuschen: Pathologie und Therapie des Wochenbetts. Frauenkrankheiten. Geburtshülfliche Uebungen am Phantom.
- Prof. Dr. Schirmer: Augenheilkunde. Ausgewählte Kapitel der Augenheilkunde. Die optischen Fehler des Auges. Augenklinik und Ambulatorium. Ophthalmoskopische Uebungen. Augenoperationscursus.
- Prof. Dr. Grohé: Allgemeine Pathologie und Therapie. Specielle pathologische Anatomie. Geschwülste. Cursus der pathologischen Anatomie.
- Prof. Dr. Krabler: Physikalische Diagnostik. Allgemeine Pathologie und Therapie des Kindesalters.
- Prof. Dr. Haeckermann: Gerichtliche Medicin. Infektionskrankheiten.

Allen diesen hochverehrten Herren Lehrern spricht Verfasser bei dieser Gelegenheit seinen wärmsten Dank aus.

THESEN.

I.

Die Abhärtung durch kalte Waschungen ist das beste Prophylacticum gegen Erkältungskatarrhe.

II.

Der Gypsverband ist zur Heilung von Fracturen das geeignetste Mittel.

III.

Bei der Reposition einer vorgefallenen Nabelschnurschlinge ist das manuelle Verfahren dem instrumentellen vorzuziehen.
